

日本SOD研究会がおとどけする

健康増進と病気・老化予防のQ&A

No. 1

活性酸素に起因する動脈硬化と 脳疾患(脳出血や脳血栓)&心疾患(狭心症や心筋梗塞)

引用資料


福内靖男・慶應大学医学部教授ほか「成人病のまえぶれ」(日本放送出版協会)

小舟井良夫・柳原記念病院長著「成人病のまえぶれ」(日本放送出版協会)

目次

- Q : 動脈硬化による脳出血と脳血栓と、脳疾患の前ぶれ症状は?
 Q : 動脈硬化による狭心症と心筋梗塞と、心疾患の前ぶれ症状は?
 Q : 脳・心疾患に対する抗酸化食品や丹羽SOD様食品の有効性は?

丹羽SOD様食品の摂取症例から
心臓症状の改善に有効な丹羽SOD様食品
 激しい不整脈が、30分でピタリと治った



Q : 動脈硬化による脳出血と脳血栓などの概略と、それらの疾患の前ぶれ(前兆)症状があれば、知りたいのですが?

始めに、本号では、活性酸素が主因となる動脈硬化によって発症する脳・心疾患の概略を記述します。次号では、活性酸素が動脈硬化を引き起こすメカニズムを詳述します。



血栓部より遠位の組織(脳細胞)は壊死してしまいます。壊死した組織は、ほとんど再生しません。

動脈閉塞による脳血栓

もろくなつた血管が破れて出血します。細い血管に起こりやすい、とされています。

このQ&Aは、病気の90%に関係するといわれる活性酸素、活性酸素を除去する丹羽SOD様食品など、さまざまな症状や疾患について、最新の情報を掲載しています。

定期的に発行されていますので、毎号お集めになりますと、健康管理ノートができます。このQ&Aは、最寄りの丹羽SOD様食品取扱店でお求めになれます。

動脈硬化に起因するその他の脳疾患

① **ラクナ梗塞**：動脈硬化により、脳の細い血管が詰まり、小さな梗塞が起こります。症状が出ないこともあります。

② **くも膜下出血**：脳を包むくも膜の下層の血管にできた動脈瘤が破裂して出血することがあります。この動脈瘤に動脈硬化が関与していることもあります。

③ **一過性脳虚血発作・脳塞栓**：次号で詳細を述べる予定ですが、この場合は、全身の動脈硬化が関連しています。

脳疾患の前ぶれ症状

脳疾患では、「一過性脳虚血発作（脳血栓）が起きてもおかしくない」といわれています。

一過性脳虚血発作は、脳の動脈が狭窄化などで狭くなり、脳が酸素不足で苦しんでいる状態です。では、脳の動脈硬化がやや進行した場合は、どんな前ぶれ症状があるのでしょか？

① **手足のシビレや筋力の低下**：片側の手足がシビレ、無力感、動きにくい

② **視力障害**：片目が突然一時的に見えなくなる。物が二重に見える

③ **平衡障害**：めまいがしたり、起立時や歩行時に身体がふらつく

④ **言語障害**：舌がもつれうまく言葉を話せない、相手の言葉を理解できず。会話中に、急に言葉が出てこなくなる

※これらの症状があれば、早期に医師の精査を受けることが必要です。

参考 高血圧性頭痛

高血圧の患者で、頭痛・めまい、不眠・手足の痺れは脳卒中の警告症状と考え、注意しましょう（これらの症状は、脳血流量が減少したとき現れます）。

Q：動脈硬化による狭心症と心筋梗塞の概略と、心疾患の前ぶれ（前兆）症状を知りたいのですが？

A：
動脈硬化による狭心症
心臓の栄養血管である冠状動脈が、動脈硬化により狭小化した、心筋の一時的な虚血状態です。

痛みは、胸全体（or胸の中央）が締付けられるような激しい痛みが特徴です。痛みの持続は10分以上で、患者は痛みのため、不安感・絶望感を訴えます。

極めて怖い疾患です。発症者の約40%が死亡、約半数が発作後1時間以内に死亡するといわれています。

に、顎・喉・歯に及ぶこともあります。

痛みの持続時間は、5～10分程度の場合が多いようです。なお、心臓の冠状動脈は、壁が厚くて丈夫なため、脳のように破れて出血はしません。



心疾患の前ぶれ症状

心疾患では、「狭心症を認めれば、いつ心筋梗塞が起きてもおかしくはない」といわれています。

狭心症は、冠状動脈が動脈硬化などで狭くなり、心臓が酸素不足で苦しんでいる状態です。狭心症になると以前の動脈硬化が進んだ状態では、たとえば、以下のようない前ぶれ症状があります。

- ① 慢性的な肩こり（左側）が続く
- ② 肝臓（腹部右側）辺りが痛む
- ③ 急に寒い所へ出ると、胸が痛む
- ④ 動きが辛い：階段の昇降や素早く動くことが、いつもよりつらい
- ⑤ 食後や飲酒後に、胸やけや胃痛に似た痛みがある

※要するに、いつもと違う、痛みや息苦しさ・動悸・胸やけなどの異常

を感じたら、すぐ医師の診察を受けましょ。

Q : 動脈硬化による脳・心疾患の、

日常生活上の対策は?

活性酸素に起因する動脈硬化、およびその進行過程については次号に掲載の予定です。



食事や薬での動脈硬化の予防は困難

成人病検査や老人検査で、コレステロールや中性脂肪が高いと指摘され、いくら食事に気をつけても、薬を服用しても、それらの数値はなかなか下がらません。下がつてせいぜい20%位です。

食事や薬よりも、血液中の活性酸素を除去する方が、動脈硬化の予防

A : 既に述べたように、脳疾患には脳出血や脳血栓、また脳梗塞などがあり、心疾患には狭心症と心筋梗塞があります。これらはいずれも、動脈硬化が主因であり、動脈硬化の予防は脳・心疾患の予防といえます。

にとつて、大切であり、効果もあります。そのためには、効果のある活性酸素除去剤（丹羽SOD様食品）を摂取すれば、動脈硬化・脳疾患の予防になるわけです。

※この項は、丹羽朝貞・七佐清水病院長：「激増活性酸素が死を招く」から引用しました。

脳血栓に有効な丹羽SOD様食品

丹羽朝貞博士の開発した丹羽SOD様食品は、自然の植物から作られた、副作用のない抗酸化食品で、この丹羽SOD様食品を毎日食べている人は、動脈硬化に起因する脳血栓にあまりかかりません。

心筋梗塞や脳血栓は、一度発病するとよく再発します。（中略）

丹羽SOD様食品は、脳血栓に有効で、4～6包毎日常用しておられる人々には脳血栓の再発は滅多に起こりません。

※この項は、丹羽朝貞・七佐清水病院長：「激増活性酸素が死を招く」から引用しました。

類して調べました。

その結果、抗酸化食品の摂取群の

人達は非摂取群の人達に比べて、狭心症や心筋梗塞が半分位に減ることが判りました。

調査2

また、ボストンで看護婦さん8万人を7年間調査した結果も同じでした。

結 果

この調査で特徴的なことは、コレステロール（LDL・HDL）や中性脂肪の濃度が全く変わらないのに、狭心症や心筋梗塞が半分位に減ることです。

★半減した理由は、抗酸化食品でLDLコレステロールの酸化が抑えられたことで、狭心症や心筋梗塞が未然に防げたことを示したものです。

※この項は、中村治雄・防衛医科大学教授：「新しい動脈硬化の予防と治療」から引用しました。なお、丹羽SOD様食品も、多くの臨床試験を有する、優れた抗酸化食品です。


編者コメント：原文では、抗酸化食品をビタミンE（300mg/日）としています。しかし、ビタミンEは油性のため、体内に蓄積され副作用の心配や化学合成品では有効性が疑問な

どのがあります。

心筋梗塞の予防に有効な抗酸化食品

調査1

スタンファー教授（アメリカハーバード大学）は、学生4万人の心疾患の発生を、抗酸化食品の摂取群と非摂取群に分



幸運にも、丹羽博士の抗酸化食品が手元にあつた
ところで、その年の春ごろ、私は、抗酸化食品の生みの親である上佐清水病院長の丹羽朝負博士と知り合いだつた知人を通じて抗酸化食品を手に入れおりました。（中略）
そんなわけで、ちらりとその抗酸化食品のこと思い出しました。半ば無意識のうちに葉緑物質

で今晚いつてしまふんではないか、と縁起でもないことを、ちらちらと頭の隅で考えていました。
突然激しい不整脈が、私を襲い、死を覚悟した
平成元年の秋、私はすんでのところで、危ないところで、いきかけたことがあります。
突然、前ぶれもなく、激しい不整脈に見舞われたのです。
(中略) 私自身、ひよつとして今晩いつてしまふんではないか、と縁起でもないことを、ちらちらと頭の隅で考えていました。



激しい不整脈が、30分でピタリと治まつた
丹羽SOD様食品

藤平健・日本東洋医学会会員・医学博士

心臓症状に有効な

以下に、丹羽SOD様食品を、実際に摂取していたとき、さまざまな症状や疾患が改善された症例を、掲載いたします。

丹羽SOD様食品の摂取症例から

ひどい不整脈がウソのようにピタリと治まつた
そのあと、30分ほど横になつて安静にしていたところ、ひどかつた不整脈が、まるでウソのようになびいたのです。これには、当人である私がいちばんびっくりしました。

その夕方は、かねて約束のあつた私の講演会に出掛けました。もちろん、講演会先でも、帰つて

からも、心臓はなんとも異常がありませんでした。

毎日服用し、一門の医師にも推薦しています

これは確かにすごいものだと思った私は、それから毎日、抗酸化食品を欠かさず服用するようになりました。(中略) それ以来、私は自分自身、あるいは私の一門の医師を通じて、この抗酸化食品を患者に勧めています。(後略)

激しい不整脈の発作を素早く止めた抗酸化食品

30分でピタリと治まりびっくり
（本文は省略されています）

※この項は、月刊社説（92-04）から引用しました。なお、文中の抗酸化食品は丹羽博士が研究・開発されたものです。

丹羽SOD 様作用食品

